

# ระวัง!!! Castor oil derivative/Polysorbate80

สามารถทำให้เกิด infusion reaction ได้นะ



ตัวอย่างอาการ

infusion reaction

Infusion reaction สามารถป้องกันได้จากการให้ Rate และ Concentration ที่เหมาะสม

รายการยาที่มีส่วนประกอบของ Castor oil derivatives/Polysorbate80 ที่มีในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

Castor oil  
derivatives

**Sandimmun® Inj 50 mg/mL (Cyclosporine)**

การเจือจางยา: ยา 50 mg (1 mL) ใช้ NSS หรือ D5W 20-100 mL  
อัตราเร็วในการบริหารยา: หยดเข้าหลอดเลือดดำช้าๆ ใช้เวลา 2-6 ชั่วโมง

Castor oil  
derivatives

**Prograf® IV 5 mg/mL (Tacrolimus)**

การเจือจางยา: ใช้ NSS หรือ D5W เจือจางยาให้ได้ความเข้มข้นสุดท้ายที่ 0.004-0.02 mg/mL  
อัตราเร็วในการบริหารยา: หยดเข้าหลอดเลือดดำช้าๆ ใช้เวลา 24 ชั่วโมง

Polysorbate  
80

**Cordarone® Inj 150 mg/3 mL (Amiodarone)**

การเจือจางยา: ใช้ D5W กรณีบริหารยามากกว่า 1 ชั่วโมง ทาง peripheral vein ความเข้มข้นสุดท้าย  
ไม่ควรเกิน 2 mg/mL หากความเข้มข้นมากกว่า 2 mg/mL ควรบริหารยาทาง central line  
อัตราเร็วในการบริหารยา: the initial rate of infusion should not exceed 30 mg/min

ยาเคมีบำบัดชื่อการค้านี้ให้บริหารยาตาม Protocol อย่างเคร่งครัด: Intaxel®, Torisel®, Remicade®, Actemra®, Benlysta®



Flushing,  
Blood pressure change,  
Tachycardia



Urticaria



wheeze-  
bronchospasm,  
hypoxemia




abdominal pain,  
crampy,  
vomiting

ร่วมด้วยช่วยกัน ป้องกันอาการไม่พึงประสงค์จากยา หากพบอุบัติการณ์ กรุณาโทรแจ้งทีเบอร์ 36312 (หน่วยเภสัชสนเทศ) และบันทึกข้อมูลลงในโปรแกรมรายงานความเสี่ยง

แหล่งข้อมูลการผสมและการบริหารยา


01

Sticker  
E-MARs



02

ฉลากยา




03

ข้อมูลยาฉีด  
(เล่มเขียว)



04

ปุ่มคำแนะนำยาฉีด  
(ในระบบสั่งยา signature  
เฉพาะ ward verify)



หมายเหตุ cordarone สามารถบริหารยาได้หลายรูปแบบ โดยดูข้อมูลได้จากคู่มือยาฉีดและปุ่มคำแนะนำยาฉีด ไม่มีข้อมูลใน sticker E-MARs และฉลากยา)