



บริหารยาฉีด Ciprofloxacin, Levofloxacin ถูกวิธี

ลดการเกิด Phlebitis ได้

Ciprofloxacin

Levofloxacin

รูปแบบยาที่มี
ใน รพ.

- Cifloxin[®] inj. (200mg/100mL)
- Ciprobay[®] inj. (400mg/200mL)

- Cravit[®] inj. (500mg/100mL และ 750mg/150mL)
- Lefloxin[®] inj. (500mg/100mL)

การเจือจาง
ด้วยสารน้ำ



ไม่ต้องเจือจาง ยาเป็นรูปแบบพร้อมใช้
(ready to use) หากต้องการเจือจาง
สามารถผสมด้วย D5W, NSS ได้



ความเข้มข้น
ก่อนให้ยา

ช่วงความเข้มข้นที่แนะนำ **0.5 – 2 mg/mL**
Max conc. = **2 mg/mL**

Final conc. = **5 mg/mL**
Max conc. = **5 mg/mL**

ระยะเวลา
การบริหาร
ยา

IV infusion : **≥ 60 นาที**

****ห้ามให้ IV Push****

IV infusion :

- 250-500 mg : **≥ 60 นาที**
- 750 mg : **≥ 90 นาที**

****ห้ามให้ IV Push****

หมายเหตุ

ไม่แนะนำให้รวมกับยาในกลุ่ม penicillins สารละลาย heparin และ
สารละลายที่มีฤทธิ์เป็นด่าง

- ควรใช้ให้หมดภายใน 3 ชั่วโมง หลังเปิดขวด
- เก็บยาให้พ้นแสง หลังนำยาออกจากกล่องควรใช้ใน 3 วัน



อาการไม่พึงประสงค์
จากการบริหารยาฉีด
ciprofloxacin,
levofloxacin อย่าง
ไม่เหมาะสม อาจทำ
ให้ผู้ป่วยเกิดอาการ
Phlebitis (ปวด
บวม แดง ร้อน
หลอดเลือดดำ
แข็ง) แต่สามารถ
ป้องกันได้ หากใช้ยา
อย่างถูกวิธี