

ยาฉีด Multiple dose ที่เบิกใช้สำหรับผู้ป่วยหลายราย

ยา **multiple dose** คือ ยาที่มีการบรรจุสำหรับใช้ได้มากกว่า 1 ครั้ง และหลังจากเปิดใช้แล้ว หากเก็บไว้ในสภาวะอุณหภูมิที่เหมาะสม จะยังคงมีประสิทธิภาพจนถึงวันเวลาที่กำหนด

ยาฉีด **multiple dose** ที่เบิกใช้สำหรับผู้ป่วยหลายราย คือ ยา multiple dose ที่เบิกมาบริหารยา 1 หน่วย ต่อผู้ป่วยมากกว่า 1 คน

แนวทางปฏิบัติสำหรับยาฉีด multiple dose

1. เมื่อเปิดใช้ยาฉีด multiple dose ครั้งแรก ต้องระบุวันที่และเวลาที่เปิดใช้ รวมทั้งวันหมดอายุทุกครั้ง แล้วนำมาติดที่ขวดยาหรือเขียนในฉลากยาข้างขวด (ดังแสดงในรูป)

วันเปิดใช้.....เวลา.....

วันหมดอายุ.....เวลา.....

2. การดยา ให้เช็ดบริเวณที่จะแทงเข็มด้วย ethyl alcohol solution 70% v/v และใช้เข็มที่ปราศจากเชื้อเท่านั้นในการดยา และปฏิบัติตามหลักการ aseptic technique อย่างเคร่งครัด

จัดทำโดย : คณะทำงานวางระบบเก็บและสำรองยา

การบริหารจัดการยา

1. การเบิกยา : เบิกในนามหอผู้ป่วย/หน่วยงานโดยใช้สมุดเบิกยาสำรองสำหรับหอผู้ป่วย (เล่มชมพู)

ยกเว้น Ketamine inj ให้ใช้สมุดเบิกยาสำรองพร้อมแนบใบบันทึกรายชื่อผู้ป่วยที่ใช้วัตถุออกฤทธิ์ ประเภท 2 (Ketamine inj 50 mg/mL 10 mL) และขวดยาเดิมที่ใช้ไปในการเบิกยา

2. การบริหารยา : สามารถบริหารแบบ 1 หน่วย ต่อผู้ป่วยมากกว่า 1 คน โดยให้ระบุวัน-เวลาที่เปิดใช้ครั้งแรก รวมถึงวันหมดอายุทุกครั้ง และเก็บรักษายาไว้ตามข้อมูล ความคงตัวของยาแต่ละชนิด

รายการยาฉีด Multiple Dose ที่เบิกใช้สำหรับผู้ป่วยหลายราย ของ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่

รายการยา	ชื่อการค้า
Lidocaine HCl	- Lidocaine HCl® (GPO) inj 1% 20 mL
	- Lidocaine HCl® (GPO) inj 2% 20 mL
Lidocaine with Adrenaline	- Xylocaine 1% adrenaline® 20 ml (1: 200,000)
	- Xylocaine 2% adrenaline® 20 ml (1: 200,000)
Heparin	- Heparin Leo® 5,000 IU/mL inj.(5 mL)
Triamcinolone acetonide	- Kanolone IA/ID® inj.(5mL)
	- Kanolone F® Inj 40 mg/ml
Ketamine	- Ketamine inj 50 mg/mL(10mL)