

กรณีที่ใช้กับผู้ป่วยติดเชื้อรุนแรง

ผู้ป่วยติดเชื้อรุนแรงได้แก่

- ผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยาในกลุ่ม Carbapenems (Carbapenem-Resistant Enterobacteriaceae : CRE)
- ผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยา Vancomycin (Vancomycin-Resistant Enterococci : VRE)
- ผู้ป่วยติดเชื้อ Covid-19



กรณีนำกล่องเข้าไปใช้ในพื้นที่ดูแลผู้ป่วย
โดยไม่ได้มีการห่อหุ้มด้วยถุงพลาสติก

1

หากมีการเปิดใช้ ให้ทำการสั่งยาในระบบ SMI
ตามรายการและจำนวนที่ใช้

2

นำกล่องและยาที่เหลือให้ทิ้งทำลายตามแนว
ทางการทำลายขยะติดเชื้อ

3

เขียนบันทึกข้อความแจ้งหมายเลขกล่องที่เปิด
ใช้ ชื่อ-สกุล HN ของผู้ป่วย ส่งมาที่ห้องยา
พร้อมรับกล่องใหม่กลับคืนไปทดแทน

กรณีนำ เฉพาะยาที่ใช้ เข้าไป
ในพื้นที่ดูแลผู้ป่วย

1

หากมีการเปิดใช้ ให้ทำการสั่งยาในระบบ SMI
ตามรายการและจำนวนที่ใช้

2

นำกล่องยาฉุกเฉินและยาที่เหลือมาส่งแลก
กล่องใหม่ที่ห้องยาได้ตามแนวทางปกติ

