

รู้หรือไม่ว่า?

พาราเซตามอล ก็แพ้ได้

ยาพาราเซตามอล ที่ใช้แก้ปวด ลดไข้ **มี**รายงานอุบัติการณ์การแพ้ยาได้



ก่อนสั่งและบริหารยาพาราเซตามอล อย่าลืมตรวจสอบประวัติแพ้ยาและสั่งยาในระบบ SMI **ทุกครั้ง** (เพื่อตรวจสอบ pop up แจ้งเตือนก่อนสั่งยา)

เนื่องจาก...

ในผู้ป่วยบางรายที่มีประวัติแพ้ยาต้านอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ (Non-Steroidal Anti-inflammatory Drugs: NSAIDs) เช่น

- Ibuprofen (Ambufen®)
- Diclofenac (Dosanac®, Volta®)
- Naproxen (Naprosian®)
- Mefenamic acid (Mefec, Ponstan®) เป็นต้น

โดยมีประวัติแพ้แบบ **Pseudoallergy** อาจพบแพ้ยาพาราเซตามอลได้ เนื่องจากยาพาราเซตามอลและ NSAIDs สามารถออกฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ COX 1 ได้เหมือนกัน*



**โปรดอย่าหยิบยืมยาพาราเซตามอล
ของผู้ป่วยรายอื่นมาใช้นะคะ**

