

นิยามการแพ้ยากลุ่มเดียวกัน/การแพ้ยาข้ามกลุ่มของยาลดการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ (Non-steroidal anti-inflammatory drugs; NSAIDs)

ยาลดการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์
(NSAIDs) แบ่งเป็น 2 กลุ่มย่อย

1. กลุ่มย่อย NON-SPECIFIC COX INHIBITOR NSAIDS (NSCIS NSAIDS)

ชื่อสามัญยา	ชื่อการค้ายามีในโรงพยาบาล
Acemetacin	Aceo Retard®
Aspirin	Aspent®, Aspent-M®, Cardiprin-100®
Diclofenac	Dosanac®, Voltaren®, Volta®
Esflurbiprofen	Locoa®
Ibuprofen	Ambufen®, Ibrofen®
Indomethacin	Elmethacin® Spray
Ketorolac	Ketromax®
Loxoprofen	Japrolox®
Mefenamic acid	Mefec®
Meloxicam	Melox®
Naproxen	Naprosian®
Piroxicam	Flamic®
ชื่อยาสามัญที่ไม่มีในโรงพยาบาล ได้แก่ Diflunisal, Nabumetone, Floctafenine, Sulindac	

หากผู้ป่วยมีประวัติแพ้ยาในตารางนี้ และได้รับยาในตารางนี้ โดยเกิดจากความบกพร่องของระบบโรงพยาบาล จัดเป็น
“แพ้ยาข้ามกลุ่มเดียวกัน”

2. กลุ่มย่อย SPECIFIC COX INHIBITOR NSAIDS (SCIS NSAIDS)

ชื่อสามัญยา	ชื่อการค้ายามีในโรงพยาบาล
Celecoxib (จัดอยู่ในกลุ่ม Sulfonamide ด้วย)	Celebrex®
Etoricoxib	Arcoxia®
Parecoxib (จัดอยู่ในกลุ่ม Sulfonamide ด้วย)	Dynastat®

หากผู้ป่วยมีประวัติแพ้ยาในตารางนี้ และได้รับยาในตารางนี้ โดยเกิดจากความบกพร่องของระบบโรงพยาบาล จัดเป็น
“แพ้ยาข้ามกลุ่มเดียวกัน”

หากผู้ป่วยมีประวัติแพ้ยาในตารางหนึ่ง และได้รับยาอีกตารางหนึ่ง โดยเกิดจากความบกพร่องของระบบโรงพยาบาล จัดเป็น
“แพ้ยาข้ามกลุ่ม”

แพ้ยาข้ามกลุ่มเดียวกัน ของยา NSAIDS

หมายถึง ผู้ป่วยได้รับยากกลุ่ม NSAIDs ที่มีโครงสร้างยากกลุ่มย่อยเดียวกัน กับที่เคยมีประวัติแพ้ในอดีต โดยมีสาเหตุจากความบกพร่องของระบบโรงพยาบาลทุกระดับ

ตัวอย่าง ผู้ป่วยมีประวัติแพ้ Aspirin และครั้งนี้ได้รับ Naproxen โดยมีสาเหตุจากความบกพร่องของระบบโรงพยาบาล

แพ้ยาข้ามกลุ่มกัน ของยา NSAIDS

หมายถึง ผู้ป่วยได้รับยากกลุ่ม NSAIDs ที่มีโครงสร้างยากกลุ่มย่อยต่างกัน กับที่เคยมีประวัติแพ้ในอดีต โดยมีสาเหตุจากความบกพร่องของระบบโรงพยาบาลทุกระดับ

ตัวอย่าง ผู้ป่วยมีประวัติแพ้ Diclofenac และครั้งนี้ได้รับ Celebrex โดยมีสาเหตุจากความบกพร่องของระบบโรงพยาบาล