

16. Packed red cell, leukocyte poor, irradiated ค
เงื่อนไข
 ใช้กับผู้ป่วยปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือด
17. Platelets concentrate, irradiated ค
เงื่อนไข
 ใช้กับผู้ป่วยปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือด
18. Packed red cell, leukocyte depleted irradiated ง
เงื่อนไข
 ใช้กับผู้ป่วยปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดที่เคยแพ้ต่อ Packed red cell, leukocyte poor, irradiated

9.1.2 Drugs used in hypoplastic, hemolytic and renal anemias

1. Folic acid tab (เฉพาะไม่น้อยกว่า 5 mg) ก
2. Oxymetholone tab ข
3. Deferiprone tab (เฉพาะ 500 mg) ค
4. Deferoxamine mesilate (Desferrioxamine mesilate) sterile pwdr ค
หมายเหตุ
 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในกลุ่มยา 16
5. Iron sucrose sterile sol ค
เงื่อนไข
 ใช้สำหรับรักษา iron deficiency anemia ในผู้ป่วย chronic kidney disease ที่ไม่ตอบสนองต่อ iron supplement ชนิดรับประทาน
6. Antithymocyte immunoglobulin, rabbit (ATG) sterile pwdr, sterile sol จ(2)
เงื่อนไข
 ใช้สำหรับ severe aplastic anemia โดยมีแนวทางกำกับการใช้ยาเป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก 3
หมายเหตุ
 จัดเป็นบัญชี ง เมื่อใช้กรณีปลูกถ่ายอวัยวะ ดูข้อ 8.2 Drugs affecting the immune response
7. Deferasirox tab (เฉพาะ 250 mg) จ(2)
เงื่อนไข
 1. Transfusion Dependent Thalassemia ใช้เป็นยารักษาลำดับแรกในผู้ป่วยอายุ 2-6 ปี โดยมีแนวทางกำกับการใช้ยาเป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก 3
 2. ใช้เป็นยารักษาลำดับที่ 2 ในผู้ป่วยอายุตั้งแต่ 6 ปี ขึ้นไปที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาหรือมีผลข้างเคียงที่รุนแรงจากการรักษาด้วยยา deferiprone โดยมีแนวทางกำกับการใช้ยาเป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก 3
8. Epoetin alfa (epoetin alpha) sterile pwdr/sterile sol (เฉพาะ 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 IU) จ(2)
เงื่อนไข
 ใช้สำหรับภาวะเลือดจางจากโรคไตเรื้อรังที่ไม่พบสาเหตุอื่นที่รักษาได้ โดยมีแนวทางกำกับการใช้ยาเป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก 3
9. Epoetin beta sterile sol (เฉพาะ 2000, 3000, 5000 IU) จ(2)
เงื่อนไข
 ใช้สำหรับภาวะเลือดจางจากโรคไตเรื้อรังที่ไม่พบสาเหตุอื่นที่รักษาได้ โดยมีแนวทางกำกับการใช้ยาเป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก 3