

## 4.10 Drugs used in substance dependence

### 4.10.1 Drugs used in alcohol dependence

1. Disulfiram tab ค

#### เงื่อนไข

ใช้กับผู้ป่วยติดแอลกอฮอล์ที่ยินยอมจะใช้นี้ร่วมกับวิธีจิตสังคมบำบัดเพื่อเป็นการควบคุมตนเองไม่ให้กลับไปดื่มซ้ำ

#### คำเตือนและข้อควรระวัง

การกินยา Disulfiram ร่วมกับแอลกอฮอล์ จะทำให้เกิดอาการไม่สบายเนื่องมาจากการสะสมของ acetaldehyde ในเลือด

### 4.10.2 Drugs used in smoking cessation

1. Nortriptyline hydrochloride tab ก

### 4.10.3 Drugs used in opioid dependence

1. Clonidine hydrochloride tab ข

#### เงื่อนไข

ใช้สำหรับ heroin withdrawal

2. Methadone hydrochloride oral sol ง

ยาเสพติดให้โทษประเภท 2

#### เงื่อนไข

ใช้สำหรับผู้ป่วยติดเฮโรอีน

## 4.11 Drugs used in dementia

1. Donepezil hydrochloride tab (เฉพาะ 5 mg และ 10 mg), จ(2)  
oral disintegration tab (เฉพาะ 5 mg และ 10 mg)

#### เงื่อนไข

ใช้สำหรับภาวะสมองเสื่อมจากโรคอัลไซเมอร์ระดับรุนแรงน้อยถึงปานกลาง โดยมีแนวทางกำกับการใช้ยาเป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก 3

#### หมายเหตุ

ยาเม็ดชนิดละลายในปาก Donepezil hydrochloride ขนาด 5 mg มีราคาต่ำสุดที่ต่อซองได้เม็ดละ 15 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และยาเม็ดชนิดละลายในปาก Donepezil hydrochloride ขนาด 10 mg มีราคาต่ำสุดที่ต่อซองได้เม็ดละ 25 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) กำหนดขึ้นราคา 730 วัน นับจากวันที่ประกาศมีผลบังคับใช้เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ให้ดูตามแบบเสนอขายในเว็บไซต์ [http://ndi.fda.moph.go.th/drug\\_national/](http://ndi.fda.moph.go.th/drug_national/)