

อัปเดตข้อมูลความคงตัวของยา Multiple dose โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่						
ชื่อยา	ชื่อการค้า	สภาวะการเก็บรักษา ยาที่ยังไม่ได้เปิดใช้	สภาวะที่เหมาะสมสำหรับ ยาที่เปิดใช้แล้ว	วันหมดอายุภายหลัง จากเปิดใช้ยาครั้งแรก	เบิกใช้สำหรับ ผู้ป่วยหลายราย	หมายเหตุ
Heparin	Heparin Leo [®] 5,000 IU/mL inj. (5 mL)	T 15-25 °C	ตู้เย็น (2 - 8 °C)	14 วัน	✓	สังเกตการเกิดตะกอน และความขุ่นของยาทุกครั้งก่อนบริหารยา
Insulin	Actrapid HM 1,000 U/10 mL (vial) Insulatard HM 1,000 U/10 mL (vial) Mixtard 30 HM 1,000 U/10 mL (vial)	ตู้เย็น (2 - 8 °C)	ตู้เย็น (2 - 8 °C)	6 สัปดาห์		รายการ Insulin รูปแบบ penfill cartridge หรือ pre-filled pen และยาฉีดเบาหวานอื่น ๆ สามารถดูข้อมูลได้ตาม QR code
Ketamine	Ketamine-hameln [®] inj. 50 mg/mL (10 mL)	T <30 °C เก็บให้พ้นแสง	ตู้เย็น (2 - 8 °C) เก็บให้พ้นแสง	28 วัน	✓	- ห้ามแช่แข็ง - สังเกตการเกิดตะกอน และความขุ่นของยาทุกครั้งก่อนบริหารยา
Lidocaine HCl	Lidocaine HCl [®] inj. 1% 20 mL (GPO) และ Lidocaine HCl [®] inj. 2% 20 mL (GPO)	T ≤ 30 °C	ตู้เย็น (2 - 8 °C)	30 วัน	✓	สังเกตการเกิดตะกอน และความขุ่นของยาทุกครั้งก่อนบริหารยา
Lidocaine with Adrenaline	Dronil-A [®] 1% inj. 20 mL และ Dronil-A [®] 2% inj. 20 mL	ตู้เย็น (2 - 8 °C)	ห่อผู้ป่วยทั่วไป ตู้เย็น (2 - 8 °C)	7 วัน	✓	สังเกตสีและความใสของยาทุกครั้งก่อนใช้ยา หากพบว่ายาเปลี่ยนเป็นสีชมพู หรือมีตะกอนขุ่นเกิดขึ้นในขวดยา ให้ทิ้งยาดังกล่าวด้วยวิธีการที่เหมาะสม
			ห้องผ่าตัด T < 30 °C	3 วัน		
Triamcinolone Acetonide	Kanolone IA/ID [®] inj. 10 mg/mL (5mL)	T < 30 °C เก็บให้พ้นแสง	ตู้เย็น (2 - 8 °C) เก็บให้พ้นแสง	30 วัน	✓	สังเกตการเกิดตะกอน และความขุ่นของยาทุกครั้งก่อนบริหารยา
ยาน้ำสำหรับรับประทาน ผลิตโดยฝ่ายเภสัชกรรม		T ≤ 30 °C	T ≤ 30 °C	1 เดือน		โดยทั่วไปยาที่เบิกจากห้องยา มักถูกใช้หมดก่อน 1 เดือน ไม่แนะนำให้เก็บยาในตู้เย็น เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อลักษณะทางกายภาพของยา เช่น การละลาย การเกิดผลึก บริเวณฝาขวด และความหนืดของยา เป็นต้น ในกรณีที่ยาไม่ได้ถูกใช้ หรือใช้ไม่หมดภายใน 1 เดือน หลังเบิกจากห้องยา ผู้ดูแลควรทำการกำจัดยาดังกล่าว และควรพิจารณาลักษณะทางกายภาพของยาร่วมด้วย
ยาครีม และยาขี้ผึ้ง ที่ผลิตโดยฝ่ายเภสัชกรรม		T ≤ 30 °C	T ≤ 30 °C	1 ปี		โดยทั่วไปยาที่เบิกจากห้องยา มักถูกใช้หมดก่อน 1 ปี ไม่แนะนำให้เก็บยาในตู้เย็น เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อลักษณะทางกายภาพของยา เช่น ความหนืดของยา เป็นต้น ในกรณีที่ยาไม่ได้ถูกใช้ หรือใช้ไม่หมดภายใน 1 ปี หลังเบิก จากห้องยา ผู้ดูแลควรทำการกำจัดยาดังกล่าว และควรพิจารณาลักษณะทางกายภาพของยาร่วมด้วย
ยา multidose ที่มีจำหน่ายในท้องตลาด	อ้างอิงข้อมูลตามที่บริษัทกำหนด โดยผู้ปฏิบัติงานสามารถโทรสอบถามข้อมูลจากงานบริหารข้อมูลทางเภสัชกรรมได้ในเวลาราชการ กรณีไม่มีข้อมูลจากบริษัทยานะนำดังนี้ - ยาน้ำที่มีสารกันเสีย: ทั้งชนิดรับประทานและใช้ภายนอกหลังเปิดใช้แล้วควรเก็บไว้ไม่เกิน 6 เดือน - ยาน้ำเชื่อม: หลังเปิดใช้ควรเก็บไว้ไม่เกิน 1 เดือน และเก็บที่อุณหภูมิห้อง - ยาหยอดตา ยาป้ายตา: หากเป็นชนิดที่ใส่สารต้านเชื้อ (Preservative) โดยทั่วไปจะมีอายุไม่เกิน 1 เดือนหลังการเปิดใช้ หากเป็นชนิดไม่เติมสารต้านเชื้อควรใช้ให้หมดภายใน 1 วัน นอกจากนี้แนะนำให้พิจารณาลักษณะทางกายภาพของยาร่วมด้วย					



SMISA
Suandok Medication Safety Alert
Issue 50, July 2024

แนวทางเมื่อเปิดใช้ยา multiple dose

ตัวอย่างการระบุวันเปิดใช้และวันหมดอายุยา multiple dose

- ☒ เมื่อเปิดใช้ยา multiple dose ครั้งแรก ต้องระบุวันที่และเวลา วันที่เปิดใช้และวันหมดอายุ ทุกครั้ง
- ☒ ยาฉีดให้ปฏิบัติตามหลักการ aseptic technique อย่างเคร่งครัด

วันเปิดใช้.....เวลา.....

วันหมดอายุ.....เวลา.....