

12. Paclitaxel sterile sol ง
- เงื่อนไข**
1. ใช้สำหรับ advanced breast cancer ที่ได้รับ anthracycline มาแล้ว หรือไม่สามารถให้ anthracycline ได้
 2. ใช้เป็น adjuvant treatment สำหรับ high risk, node positive breast cancer
 3. ใช้สำหรับมะเร็งรังไข่
 4. ใช้สำหรับ advanced non-small cell lung cancer
 5. ใช้สำหรับ AIDS-related Kaposi's sarcoma
 6. ใช้เป็น second line treatment ใน nasopharyngeal cancer ระยะแพร่กระจายหรือกลับเป็นซ้ำ
 7. ใช้สำหรับ esophageal cancer
 8. ใช้เป็น first line treatment ในการรักษา advanced cervical cancer
 9. ใช้สำหรับ malignant melanoma
13. Topotecan sterile pwdr ง
- เงื่อนไข**
1. ใช้กับผู้ป่วย neuroblastoma ที่มีความเสี่ยงสูง
 2. ใช้โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก
14. Erlotinib tab (เฉพาะ 150 mg) จ(2)
- เงื่อนไข**
- ใช้เป็น first-line drug สำหรับโรคมะเร็งปอด ชนิด non-small cell lung carcinoma (NSCLC) ระยะลุกลามถึงแพร่กระจายที่มีผลตรวจการกลายพันธุ์ของยีน Epidermal growth factor receptor (EGFR) เป็นบวก โดยมีแนวทางกำกับการใช้ยาเป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก 3
15. Imatinib mesylate tab (เฉพาะ 100 และ 400 mg) จ(2)
- เงื่อนไข**
1. ใช้สำหรับ chronic myeloid leukemia (CML) โดยมีแนวทางกำกับการใช้ยาเป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก 3
 2. ใช้สำหรับ gastrointestinal stromal tumors (GISTs) ระยะลุกลามหรือมีการกระจายของโรค โดยมีแนวทางกำกับการใช้ยาเป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก 3
 3. ใช้เป็น first-line treatment สำหรับ Philadelphia chromosome positive acute lymphoblastic leukemia (Ph + ALL) โดยใช้ร่วมกับยาเคมีบำบัด โดยมีแนวทางกำกับการใช้ยาเป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก 3
16. Nilotinib hydrochloride cap (เฉพาะ 200 mg) จ(2)
- เงื่อนไข**
- ใช้เป็น second-line treatment สำหรับ chronic myeloid leukemia (CML) ที่ไม่สามารถใช้ imatinib ได้ โดยมีแนวทางกำกับการใช้ยาเป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก 3
17. Dasatinib tab (เฉพาะ 50 mg และ 70 mg) จ(2)
- เงื่อนไข**
1. ใช้สำหรับ chronic myeloid leukemia (CML) ที่ไม่สามารถใช้ imatinib หรือ nilotinib ได้ โดยมีแนวทางกำกับการใช้ยาเป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก 3
 2. ใช้เป็น second-line treatment สำหรับ Philadelphia chromosome positive acute lymphoblastic leukemia (Ph + ALL) ที่ไม่สามารถใช้ยา imatinib ได้ โดยใช้ร่วมกับยาเคมีบำบัด โดยมีแนวทางกำกับการใช้ยาเป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก 3