

- | | | | |
|----|--------------------------|--------------|---|
| 8. | Vancomycin hydrochloride | sterile pwdr | ง |
|----|--------------------------|--------------|---|

เงื่อนไข

1. ใช้สำหรับการติดเชื้อ Methicillin Resistant *Staphylococcus aureus* (MRSA) ที่รุนแรง หรือการติดเชื้อ methicillin resistant *Staphylococcus epidermidis* (MRSE)
2. ใช้สำหรับโรค infective endocarditis (IE) กรณีแพ้ยา penicillin ชนิดรุนแรง

- | | | | |
|----|-----------|-----|------|
| 9. | Linezolid | tab | จ(2) |
|----|-----------|-----|------|

เงื่อนไข

1. ใช้สำหรับโรคติดเชื้อ Methicillin Resistant *Staphylococcus aureus* (MRSA) โดยมีแนวทางกำกับการใช้ยาเป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก 3
2. ใช้สำหรับโรคติดเชื้อ Vancomycin Resistant Enterococci (VRE) โดยมีแนวทางกำกับการใช้ยาเป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก 3

หมายเหตุ

จัดเป็นบัญชี จ(1) เมื่อใช้รักษา multidrug-resistant tuberculosis (XDR-TB) ดูข้อ 5.1.9 Antituberculous drugs

5.1.8 Sulphonamides and trimethoprim

- | | | | |
|----|--|-----------------------------|---|
| 1. | Sulfamethoxazole + Trimethoprim (Co-trimoxazole) | cap, tab, susp, sterile sol | ก |
| 2. | Trimethoprim | tab | ข |

เงื่อนไข

ใช้รักษาโรคติดเชื้อที่อาจไวต่อ trimethoprim ในผู้ป่วยที่แพ้ยาในกลุ่ม sulfonamides

5.1.9 Antituberculous drugs

- | | | | |
|----|--|---|---|
| 1. | Ethambutol hydrochloride | film coated tab | ก |
| 2. | Isoniazid | tab | ก |
| 3. | Pyrazinamide | tab | ก |
| 4. | Rifampicin | cap, tab, dry syr, syr, susp | ก |
| 5. | Rifampicin
ยากำพรั้ว | oral form (for pediatric use) | ก |
| 6. | Tuberculin Purified Protein Derivative
(Tuberculin PPD) | inj | ก |
| 7. | Isoniazid + Rifampicin | cap/tab (เฉพาะ 100+150 mg และ 150+300 mg) | ข |

เงื่อนไข

ใช้เป็นยารวมในการรักษาวัณโรคในระยะ maintenance

- | | | | |
|----|---------------------------------------|-------------------------------|---|
| 8. | Isoniazid + Rifampicin
ยากำพรั้ว | oral form (for pediatric use) | ข |
| 9. | Isoniazid + Rifampicin + Pyrazinamide | tab (เฉพาะ 75 + 150 + 400 mg) | ข |

เงื่อนไข

ใช้เป็นยารวมในการรักษาวัณโรคในระยะ initial และ maintenance

19. Clofazimine cap จ(1)
เงื่อนไข
 ใช้เฉพาะโครงการการรักษาวัณโรคดื้อยา โดยมีวิธีการใช้ยาและการติดตามประเมินการใช้ยาตามที่กรมควบคุมโรคกำหนด
20. Delamanid tab จ(1)
เงื่อนไข
 ใช้เฉพาะโครงการการรักษาวัณโรคดื้อยา โดยมีวิธีการใช้ยาและการติดตามประเมินการใช้ยาตามที่กรมควบคุมโรคกำหนด
21. Linezolid tab จ(1)
เงื่อนไข
 ใช้เฉพาะโครงการการรักษาวัณโรคดื้อยา โดยมีวิธีการใช้ยาและการติดตามประเมินการใช้ยาตามที่กรมควบคุมโรคกำหนด
- หมายเหตุ**
 จัดเป็นบัญชี จ(2) สำหรับโรคติดเชื้อ Methicillin Resistant *Staphylococcus aureus* (MRSA) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน 5.1.7 Some other antibacterials
22. Moxifloxacin hydrochloride tab จ(1)
เงื่อนไข
 ใช้เฉพาะโครงการการรักษาวัณโรคดื้อยา โดยมีวิธีการใช้ยาและการติดตามประเมินการใช้ยาตามที่กรมควบคุมโรคกำหนด
23. Protionamide tab จ(1)
เงื่อนไข
 ใช้เฉพาะโครงการการรักษาวัณโรคดื้อยา โดยมีวิธีการใช้ยาและการติดตามประเมินการใช้ยาตามที่กรมควบคุมโรคกำหนด

5.1.10 Antileprotic drugs

1. Clofazimine cap ก
หมายเหตุ
 จัดเป็นบัญชี จ(1) เมื่อใช้รักษา multidrug-resistant tuberculosis (XDR-TB) ดูข้อ 5.1.9 Antituberculous
2. Dapsone tab ก

5.2 Antifungal drugs

1. Fluconazole cap ก
เงื่อนไข
 1. ใช้สำหรับ invasive fungal infection บางชนิด
 2. ใช้สำหรับ dermatomycoses
2. Griseofulvin tab ก
3. Nystatin oral susp ก
4. Saturated solution of potassium iodide (SSKI) sol (hosp) ก
5. Itraconazole cap ค
เงื่อนไข
 ใช้สำหรับโรคติดเชื้อ talaromycosis, histoplasmosis, cryptococcosis, vaginal candidiasis และ dermatomycoses