

- | | | | |
|----|--------------------|---|------|
| 3. | Octreotide acetate | sterile pwdr (ชนิดออกฤทธิ์นาน
เฉพาะ 20 และ 30 mg/vial) | จ(2) |
|----|--------------------|---|------|

เงื่อนไข

ใช้กับผู้ป่วย Acromegaly ที่ได้รับการรักษาโดยการผ่าตัดเนื้องอกหรือการฉายแสงแล้ว ระดับ Growth Hormone (GH) และ Insulin-like Growth Factor (IGF) ยังสูงอยู่ โดยมีแนวทางกำกับการใช้ยาเป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก 3

- | | | | |
|----|------------------|--------------|------|
| 4. | Thyrotropin alfa | sterile pwdr | จ(2) |
|----|------------------|--------------|------|

เงื่อนไข

ใช้สำหรับ differentiated thyroid cancer (papillary and/or follicular thyroid carcinoma) โดยมีแนวทางกำกับการใช้ยาเป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก 3

6.5.2 Posterior pituitary hormones and antagonists

- | | | | |
|----|------------------------------|--|---|
| 1. | Desmopressin acetate (DDAVP) | tab, nasal sol (nasal drop/ nasal spray),
sterile sol | ง |
|----|------------------------------|--|---|

เงื่อนไข

1. ใช้สำหรับ diabetes insipidus
2. ชนิดเม็ดใช้กับผู้ที่ไม่สามารถใช้ยาทางจมูกได้เท่านั้น

6.6 Drugs affecting bone metabolism

- | | | | |
|----|--------------------|-------------------|---|
| 1. | Alendronate sodium | tab (เฉพาะ 70 mg) | ง |
|----|--------------------|-------------------|---|

เงื่อนไข

ใช้กับผู้ป่วยโรคกระดูกพรุน ที่มีเงื่อนไขครบทุกข้อดังนี้

1. ผู้หญิงอายุ 65 ปีขึ้นไป ที่เคยมีประวัติกระดูกสะโพกหัก
2. มีค่า bone mineral density T score น้อยกว่าหรือเท่ากับ -2.5
3. ให้ยาในแต่ละรอบเป็นระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี จากนั้นหยุดยาเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปี

- | | | | |
|----|-------------------|-------------|---|
| 2. | Calcitonin-salmon | sterile sol | ง |
|----|-------------------|-------------|---|

เงื่อนไข

ใช้กับผู้ป่วย severe hypercalcemia

คำเตือนและข้อควรระวัง

ใช้ยานี้ในระยะเวลาสั้นที่สุด ในขนาดต่ำสุดที่มีประสิทธิผลการรักษา

หมายเหตุ

1. มีหลักฐานที่เป็น Randomize controlled trial หลายฉบับที่แสดงว่าผู้ป่วยที่ได้รับยา calcitonin ชนิดรับประทานและชนิดพ่นจมูก มีความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งสูงกว่ากลุ่มที่ได้รับยาหลอก
2. ยา calcitonin ชนิดพ่นจมูกมีข้อมูลชัดเจนว่ารูปแบบดังกล่าวมีความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็ง และข้อมูลด้านประสิทธิภาพยังไม่เพียงพอ จึงไม่บรรจุอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ

- | | | | |
|----|----------------------|---------------------------|---|
| 3. | Disodium pamidronate | sterile pwdr, sterile sol | ง |
|----|----------------------|---------------------------|---|

เงื่อนไข

ใช้สำหรับ severe osteogenesis imperfecta ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดกระดูกหัก