

แนวทางการสั่งใช้ยาในผู้ป่วยที่มีประวัติแพ้/ ประวัติอาการไม่พึงประสงค์จากยา (ADR)



กรณีสั่งยา **ตัวเดียวกัน** กับที่มีประวัติแพ้
(same generic) โดยประวัติ ADR เดิมจัดเป็น
Serious ADR 7 อาการ ดังต่อไปนี้

- Dress syndrome/DIHS
- Toxic epidermal necrolysis (TEN)
- Steven johnson syndrome (SJS)
- Anaphylaxis/Anaphylactic shock
- Drug induced liver injury (Severe drug induced liver injury และ Fatal drug induced liver injury)
- Acute generalized exanthematous pustulosis (AGEP)
- Malignant hyperthermia

รวมถึงกรณีผลตรวจ
ยีนแพ้ยาเป็น Positive



Lock serious ADR
ไม่สามารถสั่งยาได้

หากต้องการใช้ยา consult แพทย์ Allergist
และโทรหาเภสัชกรเพื่อปลดล็อกและสั่งยา

กรณีอื่นๆ ได้แก่

สั่งยา**ตัวเดียวกัน**กับที่มีประวัติแพ้
(Same generic) โดยประวัติ
ADR เดิมอาการ ไม่รุนแรง



-ปฏิบัติตามแนวทาง
“แนวทางการ Rechallenge/
Drug provocation test/
Desensitization ในผู้ป่วยที่มี
ประวัติแพ้ยา (ตัวเดียวกัน;
Same generic)”

scan
QR code



สั่งยา**กลุ่มเดียวกัน**กับที่มีประวัติ
แพ้ (Same group) ทุกอาการ



-เภสัชกรโทร consult แพทย์
หากแพทย์ยืนยันการใช้ยา
-พยาบาลติดตามอาการหลังให้ยา
-เภสัชกร ADR โทรติดตามหลังให้
ยาต่อเนื่อง (ระยะเวลาขึ้นกับ
ประเภท ADR) หากใช้ยาได้จะเพิ่ม
ข้อความใน pop up