



แนวทางการเลือกใช้ยาในผู้ป่วยที่มีประวัติแพ้ยากลุ่ม Antiepileptic drugs

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

ผู้ป่วยมีประวัติแพ้ยากลุ่ม
Aromatic antiepileptic drugs (AEDs)
(โครงสร้างตาม ส่วนที่ 1)

ผู้ป่วยมีประวัติแพ้ยากลุ่ม
Non-Aromatic antiepileptic drugs
(Non-AEDs) (โครงสร้างตาม ส่วนที่ 2)

ผู้ป่วยมีอาการแพ้รุนแรง:
Stevens-johnson syndrome (SJS),
Toxic epidermal necrolysis (TEN),
DRESS syndrome, AEGP, Anaphylaxis


ผู้ป่วยมีอาการแพ้แบบอื่นๆ
Type 1; urticarial, angioedema, erythema
Type 4; MP rash, fix drug eruption หรือ
ไม่ทราบอาการ

หลีกเลี่ยงการใช้ยาในกลุ่ม AEDs, เลือกใช้กลุ่ม non-AEDs


เลือกใช้ยาตัวอื่นในกลุ่ม non-AEDs
หรือ กลุ่ม AEDs ที่ไม่มีประวัติแพ้

สำหรับเภสัชกร หากแพทย์เลือกใช้ยาต่างจากแนวทางนี้ ให้โทร consult (เฉพาะ OPD ให้บันทึก Med error/Intervention ในใบชมพู่ทุกครั้ง)


ส่วนที่ 1 : ยาในกลุ่ม AROMATIC ANTIEPILEPTIC DRUGs (AEDs)




Dilantin®




Phenobarb®




Lamictal®




Mapezine®
Tegretal®




Trileptal®




Zonegran®




-



Depakine®




Topamax®




Keppra®

ส่วนที่ 2 : ยาในกลุ่ม Non - AROMATIC ANTIEPILEPTIC DRUGs (Non-AEDs)



Neuontin®
Vultin®
Gabapentin sandoz®



Lyrica®, Brillor®,
Pregabalin sandoz®