



แนวทางการป้องกันแสงสำหรับยา

จัดทำโดย งานบริหารข้อมูลทางเภสัชกรรมและสนับสนุนระบบยา ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

(Updated 1 กรกฎาคม 2569)



01



เมื่อรับยาจากห้องยา “ให้เก็บยาไว้ในกล่องเดิม” หรือในถุงสีชา จนกว่าจะทำการบริหารยา

02



หลังจากละลายผงยา (reconstitute) หรือเจือจาง (dilute) หากต้องการเก็บยาไว้ใช้ต่อ ให้ปฏิบัติตามคู่มือการบริหารยาฉีด ของโรงพยาบาล/ Pharmabot

03



ยาที่ต้องป้องกันแสง “ขณะบริหารยา” ใช้แนวปฏิบัติ ดังนี้

รายการยา	การจัดการจากห้องยา	การจัดการขณะบริหารยา
Micafungin (Mycamine®)	ห้องยา แบนถุงสีชาไปพร้อมกับยา	หุ้มเฉพาะขวด ขณะบริหารยา
ยาเคมีบำบัดที่เตรียมจากห้องเคมีบำบัด	ห้องผลิตยา หุ้มขวดยาให้หลังเตรียมยาแล้ว	หุ้มเฉพาะขวดขณะบริหารยา (ยกเว้น Dacarbazine ให้หุ้มทั้งขวด+สาย IV set)
TPN และสารอาหารที่ใช้ใน เด็กแรกเกิด ถึง 2 ปี	ห้องผลิตยา เตรียมหุ้มขวดยาให้หลังจากเตรียมยาแล้ว	หุ้มเฉพาะขวด ขณะบริหารยา
Aminoven infant 10% 100 mL, Smoflipid 20% 100 mL	ห้องยา แบนถุงสีชาไปพร้อมกับยา	หุ้มเฉพาะขวด ขณะบริหารยา



หมายเหตุ: ยาอื่นที่นอกเหนือจากรายการยาในตาราง ไม่จำเป็นต้องกันแสงขณะบริหารยา