

(ตัวอย่าง) แบบฟอร์มกำกับการใช้ยา thyrotropin alfa

สำหรับการรักษา well differentiated thyroid cancer โดยวิธี thyroid remnant ablation ด้วย I-131

(รายละเอียดการใช้ยาโปรดอ้างอิงจากแนวทางกำกับการใช้ยา)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ป่วย

1. ชื่อ-สกุล.....
2. รหัสโรงพยาบาล..... 3. HN..... 4. AN.....
5. สิทธิการรักษา ☐ สปสช. ☐ ประกันสังคม ☐สวัสดิการข้าราชการ ☐ อื่นๆ.....
6. เพศ ☐ ชาย ☐ หญิง 7. วันเดือนปีเกิด/...../..... 8. อายุ.....ปี.....เดือน
9. เลขที่ประจำตัวประชาชน
10. น้ำหนักตัว กิโลกรัม 11. ส่วนสูง เซนติเมตร

ส่วนที่ 2 ข้อมูลประกอบอนุมัติและข้อมูลการใช้ยา

กรณีขออนุมัติการใช้ยาครั้งนี้เป็น

☐ ครั้งที่ 1 วัน/เดือน/ปี ที่ให้ยา...../...../.....

☐ ครั้งที่ 2 วัน/เดือน/ปี ที่ให้ยา...../...../.....

กรณีที่พบยังมี thyroid remnant เหลืออยู่ หลังจากทำการประเินภายใน 6 - 12 เดือนแล้ว สามารถให้ยาซ้ำได้ไม่เกิน 1 ครั้ง

1. เป็นผู้ป่วยที่ไม่อยู่ในภาวะ terminally ill ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่

2. ผู้ป่วยมีลักษณะตามเกณฑ์กำหนดดังต่อไปนี้ ครบทุกข้อ

☐ 2.1 เป็น well differentiated thyroid cancer ชนิด.....

☐ 2.2 ได้รับการผ่าตัดต่อมไทรอยด์ออกแล้วด้วยวิธี

☐ near total thyroidectomy

☐ total thyroidectomy

☐ 2.3 มีลักษณะอย่างน้อย 1 ข้อในข้อต่อไปนี้

☐ 2.3.1 ได้หยุดยาไทรอยด์ฮอร์โมนเป็นเวลาอย่างน้อย 3 สัปดาห์แล้ว วัดระดับ TSH

วันที่/...../..... ผล TSH = mU/L

☐ 2.3.2 มีภาวะ hypothyroid แล้วเกิดปัญหาข้อใดข้อหนึ่ง ต่อไปนี้จึงต้องเข้ารับการรักษานในโรงพยาบาล

☐ ภาวะหัวใจล้มเหลว โดย ejection fraction < 50% หรือ ejection fraction ลดลง 10%

☐ ความดันโลหิตผิดปกติ

☐ มีระดับ electrolyte ผิดปกติ

☐ 2.3.3 เป็นผู้ป่วยจิตเวชที่มีประวัติอาการกำเริบเมื่อมีภาวะขาดไทรอยด์ และได้รับการรักษาด้วยยาทางจิตเวช

☐ 2.3.4 มีภาวะขาดฮอร์โมนไทรอยด์รุนแรงระหว่างรอรักษาด้วย I-131

• วันที่ประเิน/...../..... Zulewski score =

• วันที่ประเิน/...../..... ระดับ TSH = mU/L

☐ 2.3.5 ผู้ป่วยที่อายุน้อยกว่า 18 ปีที่มีโรคประจำตัวหรือกระจายออกนอกต่อมไทรอยด์

3. ขนาดยาที่ใช้.....mg/ml

(แนะนำ คือ หลังจากละลาย thyrotropin alfa ด้วยน้ำกลั่น 1.2 มิลลิลิตร จะได้ thyrotropin alfa 0.9 มิลลิกรัม/1 มิลลิลิตร ฉีดสารละลายที่ผสม 1 มิลลิลิตร (Thyrotropin alfa 0.9 มิลลิกรัม) เข้ากล้ามเนื้อบริเวณ สะโพก 2 ครั้ง ห่างกัน 24 ชม.)

หมายเหตุ

- เมื่อทำการประเมินภายใน 6 - 12 เดือน แล้วพบว่ายังมี thyroid remnant เหลืออยู่ สามารถให้ยาซ้ำได้โดยรวมสูงสุดไม่เกิน 2 รอบการรักษา
- ให้หยุดใช้ยาเมื่อเกิดผลข้างเคียงหรืออาการไม่พึงประสงค์ร้ายแรงที่แพทย์ผู้รักษาพิจารณาแล้วเห็นว่าเกิดผลเสียมากกว่าประโยชน์ที่จะได้รับ เช่น ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ อาเจียนรุนแรง hypersensitivity เป็นต้น

แพทย์ผู้สั่งใช้ยา..... ว.....